

INTOXICATION AUX OPIOÏDES AUX URGENCES, 2010-2018

Yves Gallien, Interne de Santé Publique
Direction Appui, Traitement et Analyse des données
Unité ABISS

FEDORU - SPF – 31 JANVIER 2020

70 000 Américains morts d'overdoses en 2017



Trump déclare l'"urgence de santé publique" sur les opiacés


Par Le Figaro | Mis à jour le 27/10/2017 à 00:00 / Publié le 26/10/2017 à 23:55

Donald Trump a élevé jeudi la crise de dépendance aux opiacés au rang d'"urgence de santé publique" et promis d'éradiquer des Etats-Unis un fléau qui tue près de 150 Américains par jour.





Jérôme Sessini/Magnum Photos

Overdose Death Rates Involving Opioids, by Type, United States, 2000-2017



RÉPARTITION D'UTILISATION DES ANTALGIQUES DANS 7 PAYS EUROPÉENS EN 2015


[source IMS MIDAS et données publiques]




- Antalgiques non opioïdes Paracétamol + Aspirine
- Antalgiques non opioïdes AINS
- Antalgiques opioïdes faibles
- Antalgiques opioïdes forts

ANSM 2019

D Mean opioid defined daily doses per 1000 inhabitants per day



B Annual prevalence of strong opioid use from 2004 to 2017



Chenaf et Al. 2019



Données démographiques :

- Âge
- Sexe
- Département de visite (Région)
- Année de passage




Données médicales :


- Diagnostic principal et associés (CIM10)
- Motif du recours (Texte Libre)

- F11** Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés
- T40** Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques
 - .0 Opium
 - .1 Héroïne
 - .2 Autres opioïdes
 - .3 Méthadone
 - .4 Autres narcotiques synthétiques
 - .6 Narcotiques sans précision

RÉSULTATS : PASSAGES


97 892 863 passages, 34 362 pour opioïdes







(A)






RÉSULTATS - HOSPITALISATION

20 359 574 hospits, 15 966 pour opioïdes



Part des codes CIM10 dans les motifs de recours aux urgences



TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION D'ALCOOL (11,2%)

INTOXICATION PAR BENZODIAZÉPINES (7,8%)


TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT LIÉS À L'UTILISATION D'OPIACÉS (4,1%)

AUTO-INTOXICATION PAR DES NARCOTIQUES ET PSYCHODYSLEPTIQUES (3,7%)

INTOXICATION PAR ANALGÉSQUES NON OPIOÏDES, ANTIPYRÉTIQUES ET ANTIRHUMATISANTS (3,0%)

SOMNOLENCE, STUPEUR, COMA (2,8%)

ÉPISODE DÉPRESSIF (2,9%)



Population 18-50 ans :

- Femmes :
 - 10,6% d'intoxication aux benzodiazépines
 - 10,5% d'intoxication à l'alcool
- Hommes :
 - 15,3% d'intoxication à l'alcool
 - 7,8% d'intoxication aux benzodiazépines

➔ Polyconsommation/addiction

Population 0-7 ans :

- 37,9% d'intoxication accidentelles
- 24,2% autres intoxications
- < 1 an : 24% de Syndrome de Sevrage (F113/F114)

➔ Intoxication accidentelle du jeune enfant et syndrome de sevrage néonatal

Population 75 ans et plus :

- Pas de code > 10%
- Coma, Insuffisance rénale aiguë, Pneumopathie, Hypovolémie, Insuffisance cardiaque, Rétention d'urine

➔ Effets secondaires des opioïdes

EN CONCLUSION

PAS DE CRISE SANITAIRE SIMILAIRE AUX ETATS UNIS

DES PASSAGES EN BAISES MAIS DES HOSPITALISATIONS EN HAUSSE

Gravité des cas en augmentation

PROBLÉMATIQUES DIFFÉRENTES SELON L'ÂGE ET LE SEXE

Messages de sensibilisations

DONNÉES OSCOUR POUR SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL :

- Validation des codes CIM10

QUE DIRE DES HOSPITALISATIONS COMPLÈTES POUR INTOXICATION AUX OPIOÏDES ?

- SNDS : PMSI MCO et PSY